



2026011495

国产保健食品备案凭证

产品名称	武夷仙芝牌破壁灵芝孢子粉
备案人	仙芝科技（福建）股份有限公司
备案人地址	福建省南平市浦城县荣华山大道35号
备案结论	按照《中华人民共和国食品安全法》《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。
备案号	食健备G202635001329
附件	1 产品说明书；2 产品技术要求
备注	

2026年06月04日





附件1

保健食品产品说明书

食健备G202635001329

武夷仙芝牌破壁灵芝孢子粉

【原料】破壁灵芝孢子粉

【辅料】无

【标志性成分及含量】每100g含：多糖 1.5g、总三萜 13g、 β -葡聚糖 1g、麦角甾醇 20mg

【适宜人群】免疫力低下者

【不适宜人群】少年儿童、孕妇、乳母

【保健功能】有助于增强免疫力

【食用量及食用方法】每日 1 次，每次 1 包，食用方法：口服，温水送服

【规格】1 g/包

【贮藏方法】密封，置干燥处

【保质期】24个月

【注意事项】本品不能代替药物。适宜人群外的人群不推荐食用本产品。





附件2

保健食品产品技术要求

食健备G202635001329

武夷仙芝牌破壁灵芝孢子粉

【原料】破壁灵芝孢子粉

【辅料】无

【生产工艺】本品经过筛、分装、包装等主要工艺加工制成。

【直接接触产品包装材料的种类、名称及标准】

复合膜、袋应符合《食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋》(GB/T 28118)。

【感官要求】应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项 目	指 标
色 泽	应呈棕色或棕褐色
滋味、气味	气微，味淡或微苦
状 态	无结块，干燥疏松细腻粉末，无粘连，无沙粒感，无正常视力可见外来异物

【鉴别】

显微鉴别：粉末呈棕色或棕褐色，置显微镜下观察，孢壁多破碎，可见多数黄褐色的大小不等的微粒、孢子破碎程度不同的壳段或孢子破碎后里面的黄色至黄褐色的内容物，少见有未破壁的孢子，不得检出子实体、菌丝、淀粉粒等异物。

【理化指标】应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
铅（以 Pb计），mg/kg	≤2.0	GB 5009.12
总砷（以 As计），mg/kg	≤1.0	GB 5009.11
总汞（以 Hg计），mg/kg	≤0.1	GB 5009.17





2026011495

水分, %	≤9.0	GB 5009.3
灰分, %	≤3.0	GB 5009.4
过氧化值, g/100g	≤0.20	GB 5009.227
破壁率, %	≥99	GB/T 29344
六六六, mg/kg	≤0.2	GB/T5009.19
铬(以Cr计), mg/kg	≤2.0	GB 5009.123
滴滴涕, mg/kg	≤0.2	GB/T5009.19
粒度	细粉	《中华人民共和国药典》
镉(以Cd计), mg/kg	≤0.5	GB 5009.15
镍(以Ni计), mg/kg	≤1.0	GB 5009.138

【微生物指标】应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数, CFU/g	≤30000	GB 4789.2
大肠菌群, MPN/g	≤0.92	GB 4789.3 MPN 计数法
霉菌和酵母, CFU/g	≤50	GB 4789.15
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	GB 4789.10
沙门氏菌	≤0/25g	GB 4789.4

【功效成分或标志性成分指标】应符合表4的规定。

表4 功效成分或标志性成分指标

项 目	指 标	检测方法
每100g产品含 多糖	≥1.5 g	精密称定样品1.0g, 其余按照《中华人民共和国药典》灵芝项下多糖含量测定
每100g产品含 总三萜	≥13.0 g	精密称定样品0.15g, 显色反应中水浴加热时间30min, 其余按照《中华人民共和国药典》灵芝项下三萜及甾醇含量测定
每100g产品含 β-葡聚糖	≥1.0 g	1 β-葡聚糖的测定
每100g产品含 麦角甾醇	≥20 mg	2 麦角甾醇的测定

1 β-葡聚糖的测定

1.1 试剂和材料





2026011495

- 1.1.1 浓硫酸（分析纯）
- 1.1.2 无水葡萄糖对照品
- 1.1.3 无水乙醇（分析纯）
- 1.1.4 硫酸蒽酮溶液：精密称取蒽酮0.1 g，加浓硫酸100 mL使溶解，摇匀，置于棕色瓶中即得。
- 1.1.5 中温 α -淀粉酶（4000U/g）
- 1.1.6 糖化酶（10000U/g）
- 1.1.7 盐酸（分析纯）

1.2 仪器和设备

- 1.2.1 分析天平（感量0.0001g，0.01mg）
- 1.2.2 分光光度计（ ± 2 nm）
- 1.2.3 玻璃回流装置
- 1.2.4 电热恒温水浴锅
- 1.2.5 离心机
- 1.2.6 容量瓶25 mL，100 mL
- 1.2.7 各规格移液管（最小刻度应不大于0.02 mL）
- 1.2.8 具塞试管15 mL
- 1.2.9 滤纸（中速定性滤纸）
- 1.2.10 离心管50mL
- 1.2.11 滴管

1.3 标准曲线的制备

1.3.1 对照品溶液的制备

取无水葡萄糖对照品12 mg，准确称取，加水制成每1mL含0.12 mg的溶液，即得。

1.3.2 标准曲线绘制

精密量取对照品溶液0.2 mL、0.4 mL、0.6 mL、0.8 mL、1.0 mL、1.2 mL，分别置15 mL的具塞试管中，各加水至2.0 mL，迅速精密加入硫酸蒽酮溶液6 mL，立即摇匀，放置15 min后，立即置冰浴中冷却15 min，取出，以相应的试剂为空白，在625 nm波长处测定吸光度，以吸光度为纵坐标，以葡萄糖质量为横坐标，绘制标准曲线。

1.4 供试品溶液的制备

取本品约2g（M），精密称定，置圆底烧瓶中，加水60 mL，静置1小时，加热回流4小时，趁热过滤，用少量热水洗涤滤器和滤渣，将滤渣及滤纸置烧瓶中，加水60 mL，加热回流3小时，趁热滤过，合并滤液，置水浴锅上蒸干，残渣用水溶解，转移至25mL（V₁）容量瓶，定容，将溶液转移至50mL离心管，加入30mg中温 α -淀粉酶，55℃水浴，酶解1h，用滴管滴入1滴（约0.02mL）0.1mol/L盐酸，加入30mg糖化酶，55℃水浴，酶解1h，离心，4000r/min，10min，取5mL上清液转移至三角烧瓶，边搅拌边缓慢滴加无水乙醇75 mL，摇匀，在4℃放置12小时，离心，4000r/min，10min，弃去上清液，沉淀物用25mL无水乙醇洗涤，离心，4000r/min，10min，沉淀物用热水溶解并转移至100 mL量瓶中，放冷，加水至刻度，摇匀，离心，取上清液，即得。

1.5 测定

精密量取供试品溶液2 mL（V₂），置15mL具塞试管中，照标准曲线制备项下的方法，自“迅速精密加入加入硫酸蒽酮溶液6 mL”起，同法操作，测定吸光度，从标准曲线上读出供试品溶液中无水葡萄糖的质量C，计算即得。

1.6 结果计算

$$W = \frac{C \times F \times V_1 / V_2}{M \times 1000} \times 100$$

式中：

- W - β -葡聚糖的含量，g/100g；
- C - 从标准曲线上查得样品的无水葡萄糖质量，mg；
- M - 样品质量，g；
- F - 稀释倍数，F = 100/5；
- V₁ - 蒸干残渣经热水溶解定容的体积数值，mL；





V_2 - 参与反应的体积数值, mL。

2 麦角甾醇的测定

2.1 试剂

2.1.1 甲醇: 色谱纯。

2.1.2 无水乙醇: 分析纯。

2.1.3 甲醇: 分析纯。

2.2 标准品

麦角甾醇标准品: 麦角甾醇 ($C_{28}H_{44}O$), CAS号: 57-87-4。

2.3 标准溶液配制

2.3.1 麦角甾醇标准使用液($100 \mu\text{g/mL}$): 准确称取10mg麦角甾醇标准品, 用甲醇溶解, 定容至100mL, 此溶液每毫升相当于含 $100 \mu\text{g}$ 麦角甾醇。

2.3.2 麦角甾醇标准工作液: 吸取麦角甾醇标准使用液0.00mL、0.100mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL, 用甲醇稀释并定容至10mL。该标准系列浓度分别为 $0.00 \mu\text{g/mL}$ 、 $1.00 \mu\text{g/mL}$ 、 $5.00 \mu\text{g/mL}$ 、 $10.0 \mu\text{g/mL}$ 、 $20.0 \mu\text{g/mL}$ 、 $50.0 \mu\text{g/mL}$ 。临用前配置。

2.4 仪器和设备

2.4.1 高效液相色谱仪: 配置紫外检测器。

2.4.2 分析天平: 感量 0.0001g 、 0.01mg 。

2.4.3 注射器: 一次性, 10mL。

2.4.4 微孔过滤膜: $0.45\mu\text{m}$, 有机相。

2.5 分析步骤

2.5.1 试样溶液的制备

取本品约1g, 精密称定, 置具塞锥形瓶中, 精密加入无水乙醇50mL, 称定重量, 超声提取10min, 放冷, 再称定重量, 用无水乙醇补足减失的重量, 摇匀, 过滤取续滤液, 即得。

2.5.2 仪器参考条件

2.5.2.1 色谱柱: C_{18} 色谱柱, 或性能相当者。

2.5.2.2 流动相: 100%甲醇。

2.5.2.3 流速: 1.0mL/min 。

2.5.2.4 检测波长: 282nm 。

2.5.2.5 进样量: $10\mu\text{L}$ 。

2.5.3 标准曲线的制作

将标准系列工作液注入高效液相色谱仪中, 测定相应的麦角甾醇峰面积, 以标准工作液的浓度 ($\mu\text{g/mL}$) 为横坐标, 以峰面积为纵坐标, 绘制标准曲线。

2.5.4 试样溶液的测定

按照2.5.2的色谱条件, 将试样溶液注入高效液相色谱仪中, 得到麦角甾醇的峰面积, 根据标准曲线计算得到待测液中麦角甾醇的浓度。

2.6 结果计算

$$X = \frac{c \times V \times 100}{m \times 1000}$$

式中:

X——试样中麦角甾醇的含量, 单位为毫克每克 ($\text{mg}/100\text{g}$);

c——由标准曲线计算得到的试液中麦角甾醇的浓度, 单位为微克每毫升 ($\mu\text{g/mL}$);

V——试液的定容体积, 单位为毫升 (mL);

m——试样的质量, 单位为克 (g);

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示, 结果保留三位有效数字。

2.7 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

【 净含量及允许负偏差指标 】





粉剂的净含量及允许负偏差指标应符合JJF 1070规定。

【原辅料质量要求】

1、破壁灵芝孢子粉原料要求

项 目	名 称	主要内容
原料	破壁灵芝孢子粉	应符合《保健食品原料目录 破壁灵芝孢子粉》的原料技术要求的规定
原料来源		多孔菌科真菌赤芝 (<i>Ganoderma lucidum</i> (Leys. ex Fr.) Karst.) 的干燥成熟孢子
原料生产厂商		仙芝科技(福建)股份有限公司
原料的质量标准		符合《保健食品原料目录 破壁灵芝孢子粉》的要求, 其中破壁率 $\geq 99\%$

【灵芝孢子粉原料要求】

表1.1、灵芝孢子粉原料要求

项目名称	主要内容
原料来源	来源于多孔菌科真菌赤芝 (<i>Ganoderma lucidum</i> (Leys. ex. F r.) Karst.)
原料生产厂商	仙芝科技(福建)股份有限公司
原料的质量标准	企业标准(具体指标如下)
破壁灵芝孢子粉的主要生产工艺	过筛除杂, 蒸汽灭菌(115°C, 30min), 低温物理破壁
破壁灵芝孢子粉的质量标准	符合《保健食品原料目录 破壁灵芝孢子粉》的要求, 且破壁率 $\geq 99\%$
总汞(以Hg计), mg/kg	≤ 0.1
滋味、气味	气微、味淡或微苦
滴滴涕, mg/kg	≤ 0.2
总砷(以As计), mg/kg	≤ 1.0
铅(以Pb计), mg/kg	≤ 2.0
多糖, g/100g	≥ 0.9
状态	无结块, 干燥疏松细腻粉末, 无粘连, 无沙粒感, 无正常视力可见外来异物
镉(以Cd计), mg/kg	≤ 0.5
铬(以Cr计), mg/kg	≤ 2.0
镍(以Ni计), mg/kg	≤ 1.0





2026011495

色泽	应呈棕色或棕褐色
灰分, %	≤ 3.0
水分, %	≤ 9.0
六六六, mg/kg	≤ 0.2

